LÓGICA COMPUTACIONAL
LÓGICA MODAL

Francisco Hernández Quiroz

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias, UNAM
E-mail: fhq@ciencias.unam.mx
Página Web: www.matematicas.unam.mx/fhq

Facultad de Ciencias

Lógica modal

- La lógica modal originalmente intentaba capturar el significado de los operadores "es necesario que…" y "es posible que …"
- Estos operadores no se pueden definir por medio de funciones booleanas.
- Otros conceptos también se pueden expresar como operadores modales: temporalidad, acciones, conocimiento, etc.
- La semántica de estos conceptos es similar a la semántica de necesidad y posibilidad.
- Esto ha permitido aplicar la lógica modal en ámbitos distintos a la filosofía: matemáticas, computación, teoría de juegos, etc.

Sintaxis de la lógica modal proposicional

La sintaxis de la lógica modal proposicional es:

$$\alpha ::= p_i \mid q_i \mid r_i \mid \neg\alpha \mid (\alpha\vee\alpha) \mid (\alpha\wedge\alpha) \mid (\alpha \Rightarrow \alpha) \mid (\alpha \Leftrightarrow \alpha) \mid \Diamond\alpha \mid \Box\alpha$$

Los últimos dos operadores modales no existen en el cálculo de proposiciones

$\Diamond\alpha$	se leerá	"posiblemente α"
$\Box\alpha$	se leerá	"necesariamente α"

Alternativamente, el operador $\Box$ se puede definir en términos de $\Diamond$ (y viceversa):

$$\Box\alpha \equiv_{def} \neg\Diamond\neg\alpha.$$

Mundos posibles

La semántica de la lógica modal no se puede definir con funciones booleanas. En su lugar se emplean marcos

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{W}, \mathcal{R} \rangle,$$

donde

$$\mathcal{W} = \{w, w', \ldots\}$$

es un *conjunto de mundos posibles* y

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{W} \times \mathcal{W}$$

es una *relación de accesibilidad* entre mundos.

Satisfacción y verdad

Las proposiciones atómicas no reciben un valor de verdad único, sino uno por cada mundo posible.
Sea $\mathcal{F} = \langle \mathcal{W}, \mathcal{R} \rangle$ un marco y sea P_0 el conjunto de proposiciones atómicas.
Una función de evaluación es del tipo

$$e : P_0 \times \mathcal{W} \to \{V, F\}.$$

La relación de satisfacción $\models$ es relativa a $\mathcal{F}$, a una evaluación e y a un mundo específico $w \in \mathcal{W}$:

$$\begin{array}{lll}
\mathcal{F}, e, w & \models p & \text{sii} \quad e(p, w) = V \qquad \forall p \in P_0 \\
\mathcal{F}, e, w & \models \neg\alpha & \text{sii} \quad \mathcal{F}, e, w \not\models \alpha \\
\mathcal{F}, e, w & \models \alpha \vee \psi & \text{sii} \quad \mathcal{F}, e, w \models \alpha \text{ o bien } \mathcal{F}, e, w \models \psi \\
\mathcal{F}, e, w & \models \alpha \wedge \psi & \text{sii} \quad \mathcal{F}, e, w \models \alpha \text{ y } \mathcal{F}, e, w \models \psi \\
\mathcal{F}, e, w & \models \alpha \Rightarrow \psi & \text{sii} \quad \text{si } \mathcal{F}, e, w \models \alpha \text{ implica que } \mathcal{F}, e, w \models \psi \\
\mathcal{F}, e, w & \models \alpha \Leftrightarrow \psi & \text{sii} \quad \mathcal{F}, e, w \models \alpha \text{ sii } \mathcal{F}, e, w \models \psi
\end{array}$$

El caso de los operadores modales

El caso de los operadores modales es obviamente distinto:

$$\begin{array}{lll}
\mathcal{F}, e, w & \models \Box\alpha & \text{sii} \quad \forall v \in W \,.\, \text{si } R(w, v) \text{ entonces } \mathcal{F}, e, v \models \alpha \\
\mathcal{F}, e, w & \models \Diamond\alpha & \text{sii} \quad \exists v \in W \,.\, R(w, v) \text{ y } \mathcal{F}, e, v \models \alpha
\end{array}$$

Con estas definiciones, la satisfacción se puede generalizar:

$$\mathcal{F}, e \models \alpha \qquad \text{sii} \qquad \forall w \in W \,.\, \mathcal{F}, e, w \models \alpha.$$

En este caso, diremos que α es verdadera en e. Finalmente, definiremos *validez respecto a* un marco $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F} \models \alpha \qquad \text{sii} \qquad \forall e \,.\, \mathcal{F}, e \models \alpha,$$

y *validez en general*

$$\models \alpha \qquad \text{sii} \qquad \forall \mathcal{F} \,.\, \mathcal{F} \models \alpha.$$

Ejemplos

- En las siguientes láminas se presentarán los marcos como gráficas dirigidas.
- Los vértices corresponden a los mundos posibles u, v y w y las aristas, a la relación de accesibilidad entre mundos.
- Las fórmulas atómicas verdaderas en un mundo se escribirán dentro del círculo correspondiente. Las fórmulas que no aparecen en el círculo son falsas.
- En todos los casos se presenta dos veces el mismo marco, pero con evaluaciones distintas en cada gráfica.
- En la tercera lámina se presenta un caso aparentemente paradójico de un marco con una relación de accesibilidad vacía.

Un solo marco, dos evaluaciones



$$\begin{array}{lll}
\mathcal{F}, e, u & \models & \Diamond p \\
\mathcal{F}, e, u & \not\models & \Box p \\
\mathcal{F}, e & \models & \Diamond(p \vee q \vee r)
\end{array}$$



$$\begin{array}{lll}
\mathcal{F}, e, u & \not\models & \Diamond p \\
\mathcal{F}, e, w & \models & \Box q \\
\mathcal{F}, e & \not\models & \Diamond(p \vee r)
\end{array}$$

(falla en w)

Un solo marco, dos evaluaciones y fórmulas válidas





$$\begin{array}{lll} \mathcal{F}, e, u & \models & \Diamond p \\ \mathcal{F}, e, u & \models & \Box p \\ \mathcal{F}, e & \models & \Box p \Rightarrow \Diamond p \end{array} \qquad \begin{array}{lll} \mathcal{F}, e, u & \models & \Diamond \neg p \\ \mathcal{F}, e, u & \models & \Box \neg p \\ \mathcal{F}, e & \models & \Box \neg p \Rightarrow \Diamond \neg p \end{array}$$

$$\mathcal{F} \models \Box p \Rightarrow \Diamond p$$

Un caso en apariencia paradójico





$$\begin{array}{lll} \mathcal{F}, e & \not\models & \Diamond p \\ \mathcal{F}, e & \models & \Box p \end{array} \qquad \begin{array}{lll} \mathcal{F}, e & \not\models & \Diamond \neg p \\ \mathcal{F}, e & \models & \Box \neg p \end{array}$$

para toda fórmula α, $\mathcal{F} \models \Box\alpha$ pero $\mathcal{F} \not\models \Diamond\alpha$

Propiedades de la relación de accesibilidad

En los ejemplos anteriores se pudo apreciar que la validez de una fórmula depende de propiedades abstractas de la relación de accesibilidad. He aquí una lista de propiedades interesantes:

P_1	$\forall u \,.\, \exists v \,.\, u \to v$	serial
P_2	$\forall u \,.\, u \to u$	reflexiva
P_3	$\forall u, v \,.\, u \to v \Rightarrow v \to u$	simétrica
P_4	$\forall u, v, w \,.\, u \to v \wedge v \to w \Rightarrow u \to w$	transitiva
P_5	$\forall u, v, w \,.\, u \to v \wedge u \to w \Rightarrow v \to w$	euclidiana
P_6	$\forall u, v, w \,.\, u \to v \wedge u \to w \Rightarrow v = w$	funcional parcial
P_7	$\forall u \,.\, \exists! v \,.\, u \to v$	funcional
P_8	$\forall u, v \,.\, u \to v \Rightarrow (\exists w \,.\, u \to w \wedge w \to v)$	densa débil
P_9	$\forall u, v, w \,.\, u \to v \wedge u \to w \Rightarrow v \to w \vee w \to v \vee v = w$	conexa débil
P_{10}	$\forall u, v, w \,.\, u \to v \wedge u \to w \Rightarrow (\exists z \,.\, v \to z \wedge w \to z)$	dirigida débil

Esquemas modales

Las propiedades anteriores corresponden con los siguientes esquemas de fórmulas válidas:

S_1	$\Box\alpha \Rightarrow \Diamond\alpha$	$D(\alpha)$
S_2	$\Box\alpha \Rightarrow \alpha$	$T(\alpha)$
S_3	$\alpha \Rightarrow \Box\Diamond\alpha$	$B(\alpha)$
S_4	$\Box\alpha \Rightarrow \Box\Box\alpha$	$4(\alpha)$
S_5	$\Diamond\alpha \Rightarrow \Box\Diamond\alpha$	$5(\alpha)$
S_6	$\Diamond\alpha \Rightarrow \Box\alpha$	
S_7	$\Diamond\alpha \Leftrightarrow \Box\alpha$	$Q(\alpha)$
S_8	$\Box\Box\alpha \Rightarrow \Box\alpha$	$R(\alpha)$
S_9	$\Box(\alpha \wedge \Box\alpha \Rightarrow \beta) \vee \Box(\beta \wedge \Box\beta \Rightarrow \alpha)$	
S_{10}	$\Diamond\Box\alpha \Rightarrow \Box\Diamond\alpha$	$G(\alpha)$

Equivalencia entre propiedades de R y esquemas modales

Teorema. Sea $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$. Entonces

$$\mathcal{F} \models S_i \qquad \text{sii} \qquad R \text{ satisface } P_i.$$

Demostración. Se procede caso por caso.

Reglas de inferencia

$$MP \quad \frac{\alpha \Rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$$

$$K \quad \Box(\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow (\Box\alpha \Rightarrow \Box\beta)$$

$$N \quad \frac{\alpha}{\Box\alpha}$$

$$EN \quad \frac{\alpha \Rightarrow \beta}{\Box\alpha \Rightarrow \Box\beta} \qquad \frac{\alpha \Rightarrow \beta}{\Diamond\alpha \Rightarrow \Diamond\beta}$$

Se toma como primitiva la definición de $\Diamond$

$$\Diamond\alpha \equiv_{def} \neg\Box\neg\alpha.$$

Sistemas axiomáticos particulares

Todos los sistemas axiomáticos para lógica modal incluyen el axioma K y las reglas MP y N. La regla EN puede obtenerse a partir de K, MP y N. Otros sistemas son:

$$KD \qquad KT \qquad KB \qquad K4 \qquad K5$$

Los siguientes sistemas reciben un nombre particular

$$S4 = KT4 \qquad S5 = KT5.$$

En adelante, $\vdash_S$ designará la relación de deducibilidad en un sistema S. Algunos sistemas son "subsistemas de otros", es decir, sus teoremas son teoremas de sistemas más poderosos. Por ejemplo

$$\vdash_{KD5} \alpha \qquad \text{implica} \qquad \vdash_{S5} \alpha \qquad \forall\alpha$$

Ejemplo de demostración

El sistema T incluye al sistema D, es decir

$$\vdash_T \Box\alpha \Rightarrow \Diamond\alpha.$$

Demostración:

1	$\Box\neg\alpha \Rightarrow \neg\alpha$	Instancia de T
2	$\alpha \Rightarrow \neg\Box\neg\alpha$	Teorema $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$
3	$\Box\alpha \Rightarrow \alpha$	Instancia de T
4	$\Box\alpha \Rightarrow \neg\Box\neg\alpha$	Teorema $\alpha \Rightarrow \beta, \beta \Rightarrow \gamma \vdash \alpha \Rightarrow \gamma$
5	$\Box\alpha \Rightarrow \Diamond\alpha$	Def. de $\Diamond$

Lógicas multimodales

Una lógica multimodal tiene una sintaxis similar a la lógica modal, salvo que ahora se cuenta con un conjunto de etiquetas $\mathcal{L}$.
Sea $a \in \mathcal{L}$. La sintaxis de una lógica multimodal es

$$\alpha ::= p_i \mid q_i \mid r_i \mid \neg\alpha \mid \cdots \mid \langle a \rangle \alpha \mid [a]\alpha \mid \langle \cdot \rangle \alpha \mid [\,\cdot\,]\alpha.$$

Los símbolos modales anteriores no tienen una lectura universalmente aceptada. Una posibilidad es:

$\langle a \rangle \alpha$	se leerá	"después de transitar por a, posiblemente α"
$[a]\alpha$	se leerá	"después de transitar por a, necesariamente α"
$\langle \cdot \rangle \alpha$	se leerá	"después de cualquier transición, posiblemente α"
$[\,\cdot\,]\alpha$	se leerá	"después de cualquier transición, necesariamente α"

Semántica de las lógicas multimodales

Un marco es una terna

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{W}, \mathcal{R}, \mathcal{L} \rangle,$$

donde $\mathcal{L}$ es un conjunto de *etiquetas* y $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{W} \times \mathcal{L} \times \mathcal{W}$. Sean $w, v \in \mathcal{W}$ y $a \in \mathcal{L}$. Si $\mathcal{R}(w, a, v)$ escribiremos

$$w \xrightarrow{a} v.$$

Finalmente, sea $e : P_0 \times \mathcal{W} \to \{V, F\}$ una evaluación. Entonces

$$\begin{array}{lll}
\mathcal{F}, e, w \models p & \text{sii} & e(p, w) = V \qquad \forall p \in P_0 \\
 & \ldots & \\
\mathcal{F}, e, w \models [a]\alpha & \text{sii} & \forall v \in W \,.\, \text{si } w \xrightarrow{a} v \text{ entonces } \mathcal{F}, e, v \models \alpha \\
\mathcal{F}, e, w \models \langle a \rangle \alpha & \text{sii} & \exists v \in W \,.\, w \xrightarrow{a} v \text{ y } \mathcal{F}, e, v \models \alpha \\
\mathcal{F}, e, w \models [\,\cdot\,]\alpha & \text{sii} & \forall a \in \mathcal{L} \,.\, \forall v \in W \,.\, \text{si } w \xrightarrow{a} v \text{ entonces } \mathcal{F}, e, v \models \alpha \\
\mathcal{F}, e, w \models \langle \cdot \rangle \alpha & \text{sii} & \exists a \in \mathcal{L} \,.\, \exists v \in W \,.\, w \xrightarrow{a} v \text{ y } \mathcal{F}, e, v \models \alpha
\end{array}$$

Sistemas axiomáticos

Los siguientes axiomas son versiones multimodales de D, B, 5 y G:

$$\begin{array}{rcl}
[a]\alpha & \Rightarrow & \langle b \rangle \alpha \\
\alpha & \Rightarrow & [a]\langle b \rangle \alpha \\
\langle a \rangle & \Rightarrow & [b]\langle c \rangle \alpha \\
\langle a \rangle [b]\alpha & \Rightarrow & [c]\langle d \rangle \alpha
\end{array}$$

Sin embargo, los sistemas multimodales suelen tener axiomas específicos relacionados con su dominio de aplicación. Esto se verá en la sección de lógicas especializadas.